

FOSTIGEN MAX

REGISTRO SAGARPA Q-1013-024

SOLUCIÓN INYECTABLE

FÓRMULA

Cada mL contienen:	
Fosfomicina sódica	30 mg
Tartrato de Tilosina	
Equivalente a	78 mg
De Tilosina base	
Sulfato de Gentamicina	
Equivalente a	18 mg
De Gentamicina base	
Vehículo C. B. P.	100 mL

INDICACIONES

Es efectivo contra *Escherichia coli*, *Mycoplasma gallisepticum*, *Diplococcus pneumoniae*, *Streptococcus pyogenes*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Staphylococcus aureus* y los géneros *Klebsiella spp*, *Pseudomonas spp*, *Proteus spp*, *Salmonella spp*, *Clostridium spp*, *Neisseria spp* y *Pasteurella spp*.

DOSIS

Aplicar de 0.1 a 0.16 mL/Kg de peso corporal. (Fosfomicina: 3 a 4.8 mg/Kg; tilosina: 7.8 a 12.48 mg/kg; gentamicina: 1.8 a 2.88 mg/Kg).
Cada 12 horas por 3 a 5 días, según lo indique el médico veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular.

ESPECIES

Aves.

ADVERTENCIAS

No se administre este producto 35 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.
No se administre en aves productoras de huevo para consumo humano.
Manténgase en un lugar fresco y seco.
Fuera del alcance de los niños.
Uso veterinario exclusivamente.

PRESENTACIONES

Frasco con 10, 20, 50, 100, 250 y 500 mL



LABORATORIOS, S.A. DE C.V.