

CEFTIOFER

REGISTRO SAGARPA Q-1013-057

SOLUCIÓN INYECTABLE

FÓRMULA

Cada frasco de polvo estéril contiene:

Ceftiofur sódico 4 g.
Frasco con diluyente estéril de 100 mL

INDICACIONES

CEFTIOFER es ceftiofur sódico indicado en el tratamiento de bovinos, ovinos, equinos y caninos de las enfermedades respiratorias asociadas a *Pasteurella multocida*, hemolítica y somnus. En caninos en enfermedades causadas por *Pasteurella multocida*. En aves solo en pollitos de un día de nacidos por medio de la vacunación de Marek y evitar la colibacilosis.

DOSIS

Bovinos y ovinos: 1 a 2 mL/40 Kg (1 a 2 mg/Kg).
Porcinos: 1 a 3 mL/40 Kg (1 a 3 mg/Kg).
Equinos: 2.2 a 4.4 mL/40 Kg (2 a 4 mg/Kg).
Caninos: 0.5 ml/10 kg (2.2 mg/kg).
En todos son cada 24 horas por 3 días.
Aves: 0.08 a 0.2 mg/pollo de 1 día de edad.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular.

ESPECIES

Bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caninos y aves.

ADVERTENCIAS

Tiempo de retiro; en carne y en leche: 0 horas.
Manténgase el producto sin reconstituir en un lugar fresco y reconstituido en refrigeración (2 a 8 °C) hasta por 7 días.
Proteja de la luz solar, el color del polvo puede variar de café a blanco, el cambio de color no afecta la potencia.

PRESENTACIONES

10, 50, 100, 250 y 500 mL.



LABORATORIOS, S.A. DE C.V.